

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Protecția operatorului: Trebuie aplicate măsuri de securitate integrată a expunerii operatorului, acolo unde este posibil, în plus față de echipamentul individual de protecție de mai jos:

OPERATORII TREBUIE SĂ POARTE ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ADECVATĂ (SALOPETĂ) ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE atunci când este manipulat concentratul. SPĂLAȚI IMEDIAT CONCENTRATUL de pe piele sau ochi. NU INHALAȚI LICHIDUL PULVERIZAT. ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII, CLĂTIȚI IMEDIAT cu apă din abundență și adresați-vă medicului. CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL NU CONSUMAȚI ALIMENTE, BĂUTURI ȘI NU FUMAȚI. SPĂLAȚI MĂINILE ȘI PIELEA EXPUSĂ înainte de masă și după terminarea lucrului.

Protejarea mediului: Nu contaminați apele de suprafață sau canalele de scurgere cu produse chimice sau recipiente uzate.

Depozitarea și eliminarea: A SE PĂSTRA ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL, închis ermetic, într-un loc sigur. GOLIȚI COMPLET RECIPIENTUL și eliminați-l în condiții de siguranță. A SE EVITA CONTACTUL CU ALIMENTE, BĂUTURI ȘI FURAJE. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. ASE PĂSTRA LA DISTANȚĂ DE FOC ȘI SCÂNTEI. EVITAȚI ARUNCAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE SPECIALE/FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE.



SAFECAP®

FUNGICID

Omologat pentru folosire în România conform certificatului 119PC/22.07.2015

Granule dispersabile în apă (WG), conținând 450 g/kg cimoxanil, pentru utilizare în amestecuri împotriva manei cartofului

	<p>ATENȚIE</p> <p>Fraze de pericol H302 - Nociv în caz de înghițire. H361fd - Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.</p> <p>Fraze de precauție P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul și eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P260 - Nu inspirați ceața. P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor și a feței. P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P301+ P312 - DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Se va contacta Centrul împotriva Otrăvirilor sau un medic, dacă vă simțiți rău. P391 - Colectați scurgerile de produs. P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.</p> <p>ÎN CAZURI DE URGENTĂ LEGATE DE INTOXICARE SAU TRANSPORT SUNAȚI LA Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3; 050463 București, România: 021/318 36 06 sau 021318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00).</p> <p>EUH208 - Conține Cimoxanil. Poate provoca o reacție alergică. EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.</p> <p>SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)! SPe3 - Pentru a proteja organismeale acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață! SPe4 - Pentru a proteja organismeale acvatice nu aplicați pe suprafețe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, șine de tren și alte situații cu risc crescut de scurgere.</p> <p>Pentru a evita riscurile pentru om și mediu, respectați instrucțiunile de utilizare!</p>
--	---

A SE UTILIZA DOAR CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ

Producător și deținător al omologării:
UPL EUROPE LTD
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park
Warrington, Cheshire, WA3 6YN
Tel: +44 (0) 1925 819999

Importator:
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL
Strada Izvor 92-96, clădirea Forum III, etaj 4, birou A,
sector 5, București, România
Tel.: 021.529.55.44; Fax: 021.529.55.45

Distribuitor:
NATUREVO SRL
Str. Dealul Spirii nr. 2,
Sector 5, 050689, București
Tel: 021 4113656

AMBALAJ:
500 g

Data fabricației: consultați ambalajul

Numărul lotului: consultați ambalajul

Garantat 24 luni de la data fabricației

450 G/L CIMOXANIL

CULTURI ULTERIOARE:

Orice cultură poate fi înființata după o cultură tratată cu SAFECAP.

AMESTECAREA ȘI PULVERIZAREA:

Echipamentul trebuie curățat temeinic înainte de pulverizare. SAFECAP se amestecă ușor cu apa și trebuie adăugat direct în rezervorul de pulverizare în timpul umplerii. Spălați recipientul și adăugați spălările de clătire în rezervorul de pulverizare. Continuați să agitați până când pulverizarea este finalizată.

COMPATIBILITATEA:

SAFECAP este în general miscibil cu alte fungicide și insecticide. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilitate și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. Trebuie respectate toate celelalte cerințe sau restricții de pe eticheta(le) produselor partenere.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE PULVERIZARE:

- Imediat după aplicare, goliți complet echipamentul de pulverizare.
- Clătiți bine pulverizatorul și spălați cu jet de apă curată furtunurile și duzele brațului.
- Desprindeți și îndepărtați depunerile vizibile.
- Demontați și curățați duzele, sitele și filtrele.
- Spălați întregul sistem cu apă curată.
- Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când curățați echipamentul.
- Nu curățați în apropierea fântânilor sau a surselor de apă.
- Eliminați apele reziduale în conformitate cu reglementările locale.

CONDIȚIILE DE FURNIZARE:

Toate produsele furnizate de noi sunt de înaltă calitate și potrivite pentru utilizare. Deoarece nu putem controla condițiile de depozitare, manipulare, utilizare sau condițiile atmosferice înainte sau după aplicare, ce pot afecta performanța produselor, toate condițiile și garanțiile, legale sau de altă natură, referitoare la potrivirea produselor noastre sunt excluse. Astfel, nu ne putem asuma nicio responsabilitate privind orice lipsă de performanță, daune sau vătămări de orice natură, care apar în relație cu depozitarea, manipularea, aplicarea sau utilizarea.

©SAFECAP este o marcă comercială înregistrată a UPL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

IMPORTANT: Aceste informații sunt omologate ca parte din eticheta produsului. Toate instrucțiunile din cadrul acestei secțiuni trebuie citite cu atenție, pentru o utilizare reușită și în siguranță a produsului.

Boala combătută:

Mana cartofului (*Phytophthora infestans*).

Informații specifice culturii:

Rata de utilizare: 0,22 kg produs/hectar.

Varietăți:

Pot fi tratate toate varietățile de cartofi timpurii și târzii. Pentru culturile destinate procesării, consultați procesatorul înainte de utilizare.

RESTRICȚII:

SAFECAP trebuie utilizat doar la culturile de cartofi.

COMBATEREA BOLII:

Combaterea cu succes a manei cartofului necesită o politică de prevenire a bolii pe durata întregului sezon, care integrează măsuri de cultură precum distrugerea cartofilor crescuți spontan și a cantităților cu deșeuri de cartofi și începerea pulverizării înaintea infectării cu mană. SAFECAP, conținând ingredientul activ cimoxanil care este un sistemic local, oferă o protecție preventivă și curativă. Totuși, deoarece cimoxanil are un efect de scurtă durată, pentru a oferi o protecție de minimum 7 zile SAFECAP trebuie aplicat doar în amestec, în doza recomandată. În practică, SAFECAP trebuie adăugat în programele preventive de bază cu fungicide de contact, într-un mod rațional, atunci când riscul este mare sau atunci când este necesar un tratament curativ. Combinația de două ingrediente active va ajuta și la reducerea selecției și creșterii rezistenței unor varietăți de ciuperci. Este posibil ca fungicidele pentru cartofi să nu ofere protecție completă împotriva manei în cazul în care infecția este gravă.

VOLUMUL:

Aplicați SAFECAP în 100 până la 600 l/ha soluție de stropit, cantitățile mai mari putând fi utilizate la culturile cu densitate mare, pentru a îmbunătăți acoperirea.

MOMENTUL APLICĂRII:

SAFECAP trebuie utilizat doar într-un amestec cu un fungicid preventiv de contact în doza recomandată pentru mana cartofului. Se recomandă includerea SAFECAP în programele preventive de bază cu fungicide de contact, într-un mod rațional, atunci când riscul este mare sau atunci când este necesar un tratament curativ.

Momentul aplicării tratamentului și decizia de a amesteca SAFECAP cu un fungicid de contact trebuie să ia în considerare incidența normală a bolii în regiunea în cauză și condițiile sezonului respectiv. Prima pulverizare trebuie efectuată imediat ce există un risc de infectare cu mană sau este publicat un avertisment oficial. În absența unui avertisment, pulverizarea trebuie realizată chiar înainte ca rândurile culturii să se întâlnească.

Aplicările trebuie repetate la intervale de 7-14 zile, în funcție de incidența bolii și condițiile de infectare. Poate fi utilizat un interval de pulverizare de 7 zile atunci când riscul de infectare cu mană este ridicat și este prognozată ploaie în săptămâna următoare. Situațiile cu risc ridicat includ condiții de dezvoltare rapidă, culturi irigate, zone cu culturi intensive de cartofi, varietăți vulnerabile la mană, atunci când sunt emise avertismente repetate sau atunci când în regiune este activ un focar de mană. Intervalul de timp mai lung este recomandat în perioadele uscate. Irigarea culturilor crește riscul de apariție a manei, aceste culturi trebuind să fie întotdeauna tratate cu SAFECAP în amestec cu un fungicid de contact, cât mai repede posibil după irigare.

MANAGEMENTUL REZISTENȚEI:

Când sunt utilizate fungicide cu același mod de acțiune, timp de mai mulți ani, pe același teren, este posibil ca varietățile spontane, mai puțin vulnerabile, să supraviețuiască, să se înmulțească și să devină dominante pe respectivul teren. Astfel, se recomandă ca, acolo unde este posibil, programele de pulverizare să includă fungicide cu moduri de acțiune diferite.