

# ERBICID



Erbicid selectiv



## BENEFICII:

- ◆ Adjuvantul este încorporat.
- ◆ Proprietăți bune de acoperire.
- ◆ Sigur și prietenos cu mediul.
- ◆ Aplicare facilă cu un nivel ridicat de confort și securitate.
- ◆ Eficacitate îmbunătățită la temperaturi sub 15°C și peste 30°C.
- ◆ Reduce levigarea.
- ◆ Rezistență la radiațiile UV și IR.



## DESCRIERE PRODUS:

TALISMAN OD® este un erbicid selectiv, sistemic, ce acționează prin absorbție foliară și radiculară și inhibă acetolactat sintaza (ALS). TALISMAN OD® este folosit pentru controlul anual al buruienilor monocotile anuale și perene la porumbul de consum și de siloz.

TALISMAN OD® este transportat rapid în plantă atât prin xilem, cât și prin floem la țesutul meristematic unde inhibă biosinteza aminoacizilor, oprește diviziunea celulară și creșterea plantei în câteva ore după aplicare. Decolorarea graduală a frunzelor nou apărute este urmată de necroza acestora, deshidratare și conduce, în final, la moartea plantei. Simptomele vizuale apar la 3-4 zile după aplicarea tratamentului, iar efectul total de control al buruienilor se poate observa la 20-25 de zile. Formularea OD permite o persistență mai mare a produsului, reduce presiunea de suprafață, previne spălarea cauzată de ploaie și crește acoperirea pe frunză, îmbunătățind interacțiunea dintre plantă și produs, realizând astfel o penetrare și o asimilare a substanței active mai bune.

Număr înregistrare	Producător	Conținut substanță activă	Ambalaj
321PC/29.06.2017	GALENIKA	Nicosulfuron 40 g/l	1 l și 5 l

Cultură	Doză	Spectru de combatere	Perioada de aplicare
Porumb pentru siloz și de consum	1 - 1,5 l/ha	Talpa găștii, Ciumăfaia, Zămoșița, Sugelul, Ardeii broaștei/Iarba puricelui, Știrul, Ambrozia, Spanacul sălbatic, Drăgaica, Hrișca urcătoare	Când porumbul este în stadiul de 2 - 8 frunze (BBCH 12-18) și buruienile dicotile sunt în stadiul de 2 - 6 frunze, iar buruienile monocotile au o înălțime de 15 - 20 cm



## APLICARE:

Pe parcursul unui an poate fi aplicat cel mult o dată pe aceeași suprafață. **Nu aplicați pe o cultură tratată cu un insecticid organofosforic.** Datorită nivelului său ridicat de activitate, trebuie să se acorde atenție evitării driftului plantelor din afara zonei țintă. **Produsul nu trebuie aplicat culturilor de porumb care sunt supuse stresului, deoarece poate duce la incidența unor pagube mai persistente la culturi.**